DGK CARDIO UPDATE 2024

16. und 17. Februar

23. und 24. Februar

Herz – Niere – Hypertonie

Felix Mahfoud, Homburg

Interessenkonflikte

Forschungsunterstützung:

Deutsche Forschungsgemeinschaft, Deutsche Gesellschaft für Kardiologie, Deutsche Herzstiftung, Ablative Solutions, Medtronic, Recor.

Vortragstätigkeit/Beratertätigkeit:

Ablative Solutions, Amgen, AstraZeneca, Bayer, Boehringer Ingelheim, Inari, Medtronic, Merck, Recor, Servier, Terumo.

Herz und Niere

- Kardio-Renale Interaktion -

Kardio-Renale Interaktion

Mark PB et al. Eur Heart J. 2023;44:1157-1166

53 Jahre, eGFR 89 ml/min, 15% Diabetes

Kardio-Renale Interaktion

Mark PB et al. Eur Heart J. 2023;44:1157-1166

712.556 HF

269.142 Myokardinfarkt

605.596 VHF

311.021 Schlaganfall

Kardio-Renale Interaktion

Mark PB et al. *Eur Heart J.* 2023;44:1157-1166

Kardio-Renale Interaktion

Mark PB et al. *Eur Heart J.* 2023;44:1157-1166

Kardio-Renale Interaktion

Mark PB et al. *Eur Heart J.* 2023;44:1157-1166

Fazit:

- Nach kardiovaskulärer Erkrankung (v.a. Herzinsuffizienz) in den folgenden Monaten auch Nierenfunktion bestimmen
- Insbesondere in den ersten 3 Monaten deutlich erhöhtes Risiko (Faktor 106)!

Herz und Niere

- SGLT2-i bei hochgradiger
Niereninsuffizienz -

Dapagliflozin bei hochgradig reduzierter Nierenfunktion

Chatur S et al, JACC. 2023;82:1854-1863

Dapagliflozin bei hochgradig reduzierter Nierenfunktion

Chatur S et al, JACC. 2023;82:1854-1863

Verschlechterung der HI oder KV-Tod

Dapagliflozin bei hochgradig reduzierter Nierenfunktion

Chatur S et al, JACC. 2023;82:1854-1863

Dapagliflozin reduziert KV-Tod/HI-Verschlechterung auch bei eGFR Abnahme

Keine erhöhte Rate an unerwünschten Wirkungen

Fazit: Fortführung von Dapagliflozin auch bei eGFR <25 ml/min vorteilhaft

Herz und Niere

- Cystatin C versus Kreatinin -

Bestimmung der Nierenfunktion: Cystatin C versus Kreatinin

Tolomeo P et al. Eur Heart J. 2023;44:2202-2212

PARADIGM-HF (ARNI bei HFrEF), 1.966 Patienten mit Cystatin C und Kreatinin

mediane eGFR_{Krea} 69 ml/min

mediane eGFR_{Cys} 68 ml/min

Bestimmung der Nierenfunktion: Cystatin C versus Kreatinin

Tolomeo P et al. Eur Heart J. 2023;44:2202-2212

PARADIGM-HF (ARNI bei HFrEF), 1.966 Patienten mit Cystatin C und Kreatinin

	Alle (n=1966)	eGFR Diff. < -10 (n=260)	eGFR Diff. -10 bis 10 (n=1464)	eGFR Diff. >10 (n=242)	p-Wert
eGFR _{cys} , ml/min	62	49	61	98	<0.001
eGFR _{crea} , ml/min	69	79	65	75	0.799
NT-pro-BNP	892	1395	928	561	<0.001

Bestimmung der Nierenfunktion: Cystatin C versus Kreatinin

Tolomeo P et al. *Eur Heart J.* 2023;44:2202-2212

PARADIGM-HF (ARNI bei HFrEF), 1.966 Patienten mit Cystatin C und Kreatinin

No. at risk	0	1	2	3
eGFR diff < -10	260	210	135	59
eGFR diff -10 to 10	1464	1287	863	409
eGFR diff > 10	242	223	158	74

No. at risk	0	1	2	3
eGFR diff < -10	260	235	158	68
eGFR diff -10 to 10	1464	1363	967	486
eGFR diff > 10	242	234	170	83

Bestimmung der Nierenfunktion: Cystatin C versus Kreatinin

Tolomeo P et al. Eur Heart J. 2023;44:2202-2212

PARADIGM-HF (ARNI bei HFrEF), 1.966 Patienten mit Cystatin C und Kreatinin

Bestimmung der Nierenfunktion: Cystatin C versus Kreatinin

Tolomeo P et al. Eur Heart J. 2023;44:2202-2212

PARADIGM-HF (ARNI bei HFrEF), 1.966 Patienten mit Cystatin C und Kreatinin

Fazit:

**Differenz der Cystatin C/Kreatinin-GFR bei
HI assoziiert mit schlechtem Outcome**

Herz und Niere

- Prävention von Kontrastmittel-
assoziiertem Nierenversagen -

Prävention von Kontrastmittel-assoziiertem Nierenversagen

Liu Y et al. JACC CI. 2023;16:1503-1513

RCT, 1.002 Patienten mit CKD (eGFR 15-60 ml/min);
69 Jahre, Kreatinin 1,6 mg/dl, eGFR 46 ml/min

Vereinfachte Hydration (SH): NaCl 1-4 h vor KM-Gabe, 3 ml/kg/h
versus

Standard Hydration (Control): NaCl 12 h vor und 12 h nach KM-Gabe, 1 ml/kg/h

Primärer Endpunkt: Kreatininanstieg >25% oder 0.5 mg/dl innerhalb 48-72 h

Intravenous Hydration Volume (ml)		Contrast Volume (ml)			
1,000 (750-1,500) SH group	vs	114 ± 75 SH group	vs	1,500 (1,000-1,932) Control	118 ± 67 Control
(P < 0.001)		(P = 0.345)			

Prävention von Kontrastmittel-assoziiertem Nierenversagen

Liu Y et al. JACC CI. 2023;16:1503-1513

Prävention von Kontrastmittel-assoziiertem Nierenversagen

Liu Y et al. JACC CI. 2023;16:1503-1513

Kein Unterschied in den Subgruppen:

- Alter
- PCI
- KM-Volumen (>100 ml)
- eGFR (<30 ml/min)
- Herzinsuffizienz
- ...

Prävention von Kontrastmittel-assoziiertem Nierenversagen

Kapil N et al. Pharmacol Review. 2020;72:692-766

- Anorganisches Nitrat -> Kaliumnitrat (Rote Beete Saft)

Prävention von Kontrastmittel-assoziertem Nierenversagen

Jones DA, ESC Congress Hotline 8, Amsterdam 2023

Koronarangiographie bei NSTEMI, eGFR <60 ml/min oder 2 andere RF:
Diabetes, Leberzirrhose, >70 Jahre, keine KM-Exposition <7 d, LVEF <40%

Primärer Endpunkt: Häufigkeit von KM-induziertem Nierenversagen

Prävention von Kontrastmittel-assoziertem Nierenversagen

Jones DA, ESC Congress Hotline 8, Amsterdam 2023

80 Jahre, 46% Diabetes, LV-EF 37%, CKD 56%
175 ml KM, 50% PCI, 10% ACB-OP

9.1% vs 30.5%, $p < 0.0001$

Prävention von Kontrastmittel-assoziiertem Nierenversagen

Jones DA, ESC Congress Hotline 8, Amsterdam 2023

MAKE

All-cause mortality

Renal Replacement Therapy (RRT)

Persistent Renal Dysfunction

>50% increase in baseline serum creatinine

Placebo	320	307	266	256	252	246	175
Inorganic Nitrate	318	314	303	300	294	288	206

Prävention von Kontrastmittel-assoziiertem Nierenversagen

Jones DA, ESC Congress Hotline 8, Amsterdam 2023

Limitationen:

- Monozentrische Studie
- Hohes KM-Volumen (50% diagnostische Prozeduren)
- NSTEMI warteten 5 Tagen auf die HK-Untersuchung
- Schmeckt KNO_3 v. KCl - unterschiedlich? Entblindung?

Fazit:

Prävention von KM-induziertem Nierenversagen durch vereinfachte Hydratation und Rote Beete Saft (?)

Take Home Message I

- Enge Assoziation zwischen kardiovaskulären Ereignissen und terminaler Niereninsuffizienz. Nierenfunktionsbestimmung wichtig.
- Dapagliflozin bei HI auch bei eGFR-Abfall <25 ml/min vorteilhaft.
- Differenz der Cystatin C/Kreatinin-GFR bei HI assoziiert mit schlechtem Outcome.
- Prävention von KM-induziertem Nierenversagen: durch vereinfachte Hydratation und Rote Beete Saft (?).

Hypertonie

- Epidemiologie -

Risikofaktoren für kardiovaskuläre Morbidität und Sterblichkeit

Magnussen C et al. NEJM. 2023;389:12733-1285

1,5 Mio. individuelle Patientendaten, 112 Studienkohorten, 34 Ländern

5 modifizierbare Risikofaktoren:

- Body Mass Index
- Systolischer Blutdruck
- Non-HDL Cholesterin
- Rauchen
- Diabetes

Kardiovaskuläre Erkrankung:

- Myokardinfarkt, instabile AP, Revaskularisation, Schlaganfall, KV-Tod

Gesamtsterblichkeit

Risikofaktoren für kardiovaskuläre Morbidität und Sterblichkeit

Magnussen C et al. NEJM. 2023;389:12733-1285

Patienten	1.518.028
Weiblich	54%
Alter	54 Jahre
Zeitraum	1963-2020
BMI,	26,4 kg/m ²
SBP	130 mmHg
Non-HDL-C	157 mg/dl
Raucher	22%
Diabetes	8,3%

Risikofaktoren für kardiovaskuläre Morbidität und Sterblichkeit

Magnussen C et al. NEJM. 2023;389:12733-1285

Risikofaktoren für kardiovaskuläre Morbidität und Sterblichkeit

Magnussen C et al. NEJM. 2023;389:12733-1285

Population-attributable fractions of 10-year CVD for **single** risk factors and **geographic region**

Hypertonie

- Diagnostik -

Empfehlungen zur Blutdruckmessung

Mancia G et al. *J Hypertens.* 2023;41:1874-2071

Empfehlungen zur Blutdruckmanschettengröße

<https://hyper10sion.com/faq/blutdruck-messung-welche-manschettengroesse-soll-ich-waehlen>

- Blutdruckmanschette am Oberarm nicht zu locker oder zu fest auf Herzhöhe anzulegen
- 2 Finger Platz unter der Manschette
- Manschettengröße gemäß Herstellerangabe

Empfehlung gemäß der American Heart Association

Oberarmumfang	Manschettengröße
22 – 26 cm	12 – 22 cm
27 – 34 cm	16 – 30 cm
35 – 44 cm	16 – 36 cm
45 – 52 cm	16 – 42 cm

Einfluss der Blutdruckmanschettengröße

Ishigami J et al. JAMA Intern Med. 2023;183:1061-1068

195 Erwachsene, 54 Jahre, BMI 29 kg/m²; 3 Blutdruckmessungen
Randomisation: korrekt, zu klein, zu groß

BP cuff	Difference in systolic BP, mm Hg (95% CI)
Regular cuff 1 size too large	-3.6 (-5.6 to -1.7)
Regular cuff appropriately sized	0 [Reference]
Regular cuff 1 size too small	4.8 (3.0 to 6.6)
Regular cuff 2 sizes too small	19.5 (16.1 to 22.9)

BP cuff	Difference in diastolic BP, mm Hg (95% CI)
Regular cuff 1 size too large	-1.3 (-2.4 to -0.2)
Regular cuff appropriately sized	0 [Reference]
Regular cuff 1 size too small	1.8 (1.1 to 2.6)
Regular cuff 2 sizes too small	7.4 (5.7 to 9.1)

Einfluss der Blutdruckmanschettengröße

Ishigami J et al. JAMA Intern Med. 2023;183:1061-1068

195 Erwachsene, 54 Jahre, BMI 29 kg/m²; 3 Blutdruckmessungen
Randomisation: korrekt, zu klein, zu groß

+20 mmHg

+7 mmHg

Einfluss der Blutdruckmanschettengröße

Ishigami J et al. JAMA Intern Med. 2023;183:1061-1068

195 Erwachsene, 54 Jahre, BMI 29 kg/m²; 3 Blutdruckmessungen
Randomisation: korrekt, zu klein, zu groß

Assoziation zwischen Langzeitblutdruck und Outcomes

Staplin N et al. Lancet. 2023;401:2041-2050

**59.124 Patienten (59 Jahre; 47% Frauen), 10 Jahre Follow-up,
Indikation zur ABPM**

	All-cause death		Cardiovascular death	
	Confounder- adjusted χ^2 statistic	Informativeness*	Confounder- adjusted χ^2 statistic	Informativeness*
Clinic systolic	61.2	100%	29.1	100%
24-h systolic	293.1	479%	135.4	465%
Daytime systolic	233.0	381%	113.3	389%
Night-time systolic	361.7	591%	175.8	604%

Assoziation zwischen Langzeitblutdruck und Outcomes

Staplin N et al. Lancet. 2023;401:2041-2050

59.124 Patienten (59 Jahre; 47% Frauen), 10 Jahre Follow-up, Indikation zur ABPM

KV-Tod (n=2.361)

Adjustiert für:
u.a. Alter,
Geschlecht,
office BP, ABP,
etc.

Assoziation zwischen Langzeitblutdruck und Outcomes

Staplin N et al. Lancet. 2023;401:2041-2050

59.124 Patienten (59 Jahre; 47% Frauen), 10 Jahre Follow-up,
Indikation zur ABPM

	Number of patients	Deaths	Confounder-adjusted model	
			HR (95% CI)	p value
All patients				
Confounder adjusted				
All-cause death				
Blood pressure in normal range	10 006	1074	1.00 (ref)	..
White-coat hypertension	17 181	1824	0.90 (0.84-0.97)	0.01
Masked hypertension	4999	605	1.24 (1.12-1.37)	<0.0001
Sustained hypertension	26 938	3671	1.24 (1.15-1.32)	<0.0001

Assoziation zwischen Langzeitblutdruck und Outcomes

Staplin N et al. Lancet. 2023;401:2041-2050

59.124 Patienten (59 Jahre; 47% Frauen), 10 Jahre Follow-up,
Indikation zur ABPM

Fazit:

- Langzeitblutdruck (v.a. nächtlicher BP) prognostisch wichtiger als Praxisblutdruck.
- Maskierte Hypertonie aber nicht Weißkittelhypertonie mit erhöhtem KV-Risiko assoziiert.

	Number of patients	Deaths	Confounder-adjusted HR (95% CI)	p-value
White-coat hypertension	17 181	1824	0.90 (0.84-0.97)	<0.0001
Masked hypertension	4999	605	1.24 (1.12-1.37)	<0.0001
Sustained hypertension	26 938	3671	1.24 (1.15-1.32)	<0.0001

Hypertonie

- Medikamentöse Therapie -

Medikamentöses Management: 2023 ESH-Leitlinien

Mancia G et al. J Hypertens. 2023;41:1874-2071

Medikamentöses Management: 2023 ESH-Leitlinien

Mancia G et al. *J Hypertens.* 2023;41:1874-2071

Heterogenität von Erstlinien-Antihypertensiva

Sundström J et al. JAMA. 2023;329:1160-1169

280 Patienten mit Hypertonie, Praxis BP 154/89 mmHg, 24-h BP 145/89 mmHg
1468 Behandlungsepisoden;
Behandlung für 7-9 Wochen, dann 1 Woche wash-out, dann cross-over

Systolischer Blutdruck

Lisinopril 20 mg
vs.
Candesartan 16 mg
vs.
HCT 25 mg
vs.
Amlodipin 10 mg

Heterogenität von Erstlinien-Antihypertensiva

Sundström J et al. JAMA. 2023;329:1160-1169

Fazit:

- Hohe intraindividuelle Variabilität
- BP war höher unter HCT-Behandlung
- Kaum Unterschied zwischen: Candesartan vs. Lisinopril und Amlodipin vs. HCT
- Personalisierte Behandlung reduzierte den SBP um zusätzliche 4.4 mmHg

Hypertonie

- Neue Therapiekonzepte -

Zilebesiran: RNA-Interferenz bei Hypertonie

Touyz RM et al. *New Engl J Med.* 2023;389(3):278-281.

Zilebesiran: RNA-Interferenz bei Hypertonie

Desai AS et al. *New Engl J Med.* 2023;389(3):228-238.

Unkontrollierte Hypertonie, 52 Jahre, 144/85 mmHg
1x Injektion von Zilebesiran

Änderung des SBP korrelierte mit Änderung der Serum Angiotensinogen Konzentration ($r=0.52$; 95% KI, 0.42 to 0.61)

Zilebesiran: RNA-Interferenz bei Hypertonie

Desai AS et al. *New Engl J Med.* 2023;389(3):228-238.

Unkontrollierte Hypertonie, 52 Jahre, 144/85 mmHg
1x Injektion von Zilebesiran

Blutdruckreduktion nach 24 Wochen

Zilebesiran: RNA-Interferenz bei Hypertonie

Desai AS et al. *New Engl J Med.* 2023;389(3):228-238.

	Placebo (N=28)	All Zilebesiran (N=56)
Adverse event	24 (86)	42 (75)
Any serious adverse event‡	1 (4)	1 (2)
Any severe adverse event§	1 (4)	1 (2)
Any adverse event leading to withdrawal	0	0
Death	0	0
Adverse events occurring in ≥5% of patients		
Headache	13 (46)	10 (18)
Injection-site reaction	0	5 (9)
Upper respiratory tract infection	3 (11)	4 (7)
Adverse events of interest¶		
Hypotension	0	0
Hyperkalemia	0	0
Renal adverse event	0	0
Hepatic adverse event	0	1 (2)

Zilebesiran: RNA-Interferenz bei Hypertonie

Desai AS et al. *New Engl J Med.* 2023;389(3):228-238.

Fazit:

- BP-Senkung über 24 Wochen, Tag und Nacht
- Keine Hyperkaliämie oder Nierenfunktionsverschlechterung
- Konsequenzen bei notwendiger akuter Aktivierung des RAASs (z. B. Schock, Hypovolämie, etc.) unklar

Baxdrostat: Aldosteronsynthese-inhibitor bei resistenter Hypertonie

Freeman MW et al. NEJM. 2023;395-405

275 Patienten, min. 3 Antihypertensiva (inkl. Diuretikum, kein MRA), Office BP >130/80 mmHg, Baxdrostat (0,5/1/2 mg) oder Plazebo für 12 Wochen

Baxdrostat: Aldosteronsynthese-inhibitor bei resistenter Hypertonie

Freeman MW et al. NEJM. 2023;395-405

275 Patienten, min. 3 Antihypertensiva (inkl. Diuretikum, kein MRA), Office BP >130/80 mmHg, Baxdrostat (0,5/1/2 mg) oder Plazebo für 12 Wochen

Änderung des systolischen BP

Änderung des diastolischen BP

Baxdrostat: Aldosteronsynthase-inhibitor bei resistenter Hypertonie

Freeman MW et al. NEJM. 2023;395-405

275 Patienten, min. 3 Antihypertensiva (inkl. Diuretikum, kein MRA), Office BP >130/80 mmHg, Baxdrostat (0,5/1/2 mg) oder Plazebo für 12 Wochen

Ereignis	Plazebo	Baxdrostat
Schwere UAW	2 (3%)	12 (6%)
Hyponatriämie	0	3 (1%)
Hypotonie	0	1 (<1%)
Kalium >6 mmol/l	0	3 (1%)
Kalium 5,5-6 mmol/l	1 (<1%)	3 (1%)

Baxdrostat: Aldosteronsyntheseinhibitor bei resistenter Hypertonie

Freeman MW et al. NEJM. 2023;395-405

275 Patienten, min. 3 Antihypertensiva (inkl. Diuretikum, kein MRA), Office BP >130/80 mmHg, Baxdrostat (0,5/1/2 mg) oder Plazebo für 12 Wochen

Fazit:

- Aldosteronsynthesehemmung neuer Therapieansatz
- Deutliche Blutdrucksenkung
- Gut verträglich
- Therapie zur Behandlung anderer Erkrankungen (HI?, CKD?, primärer Hyperaldosteronismus?)

Therapieresistente Hypertonie: Empfehlung der neuen ESH Leitlinie

Mancia G et al. J Hypertens. 2023;41:1874-2071

Therapieresistente Hypertonie: Empfehlung der neuen ESH Leitlinie

Mancia G et al. J Hypertens. 2023;41:1874-2071

Renale Denervation: Neue Empfehlungen der ESC

Barbato E et al. Eur Heart J. 2023;44:1313-1330

- **Unkontrollierte Hypertonie**
 - Praxis BP $\geq 140/\geq 90$ mmHg
 - trotz Einnahme von mindestens 3 Antihypertensiva einschließlich eines Diuretikums in adäquater Dosierung
- **Ausschluss einer Weißkittelhypertonie (ABPM)**
 - 24-h-Mittelwert ≥ 130 mmHg systolisch oder Tagesmittelwert ≥ 135 mmHg systolisch
- **eGFR >40 ml/min/1,73 m²**
- **Erwägen bei Medikamentenunverträglichkeit**

Zertifizierte Zentren in Deutschland: www.rdz.dgk.org

Take Home Message II

- Auf richtige Manschettengröße achten; insbesondere bei zu kleiner Manschette wird der BP deutlich zu hoch gemessen.
- Langzeitblutdruck (insbesondere nächtlicher) prognostisch wichtiger als Praxisblutdruck. Maskierte Hypertonie aber nicht Weißkittelhypertonie mit erhöhtem KV-Risiko assoziiert.
- Hohe intraindividuelle Variabilität unter antihypertensiver Therapie. Zusätzliche BP Senkung durch personalisierte Behandlung.
- RNA-Interferenz (Zilebesiran) und Aldosteronsynthasehemmer (Baxdrostat) neue Therapiekonzepte zur BP-Senkung.
- Renale Denervation zurück in den Leitlinien (bei Therapieresistenz).